

DOCUMENTOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Anestesia general

1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La anestesia general consiste en proporcionar al paciente un estado reversible de pérdida de la conciencia, de analgesia y relajación muscular.

Para ello, es preciso realizar la punción de una vena y la introducción de un pequeño catéter (tubito de plástico) por la que se administraran los sueros y los fármacos necesarios según la situación del paciente y el tipo de cirugía previsto.

Durante la anestesia general, al estar dormido y relajado, es necesario mantener la respiración de forma artificial. Para ello, se necesita colocar un dispositivo (tubo traqueal, máscara laríngea u otro) a través de la boca o la nariz, que llega a la faringe o la tráquea. Este dispositivo se conecta a un aparato de respiración artificial cuya función será la de mantener la respiración.

El médico anestesiólogo es el encargado de realizar y controlar todo el proceso de la anestesia general de principio a fin, así como de tratar todas las posibles complicaciones que pudieran surgir.

Mediante diferentes métodos clínicos y aparatos, se controlan y vigilan las funciones vitales, cardíaca, respiratoria, cerebral y demás. Con ello se mantiene una vigilancia permanente durante todo el acto anestésico y se consigue la máxima seguridad.

2. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN ALCANZAR

El propósito de la anestesia general es permitir que el paciente sea operado sin sufrir dolor, mediante la administración de fármacos anestésicos por vía intravenosa y/o inhalatoria, procurando la máxima seguridad, comodidad y vigilancia durante el acto quirúrgico.

3. ALTERNATIVAS RAZONABLES A DICHO PROCEDIMIENTO

4. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

Las consecuencias previsibles de su realización son.....

5. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN

Si no se realiza el procedimiento podría ocurrir.....

6. RIESGOS

Aparte del riesgo de la intervención quirúrgica, del que me informará el médico cirujano, la administración de la anestesia, como sucede en todo procedimiento médico, conlleva una serie de riesgos, que son aceptados de acuerdo con la experiencia y el estado actual de la ciencia médica y que pasamos a enumerar:

- Punción accidental de la arteria. Pinchazos repetidos por dificultad en la introducción del catéter venoso, que pudiera condicionar salida de la vena de los diferentes fármacos empleados en la anestesia y provocar desde un simple enrojecimiento hasta problemas circulatorios locales.
- En algunas ocasiones, la introducción del tubo traqueal o cualquier otro dispositivo) en la traquea o en la faringe, puede entrañar gran dificultad, dando lugar a rotura de piezas dentales y a lesiones en las mucosas de la zona.
- Durante la colocación del tubo traqueal (o cualquier otro dispositivo) puede pasar al pulmón parte del contenido del estómago, ocasionando problemas respiratorios que pueden llegar a ser importantes. Es una complicación grave pero poco frecuente. Una forma de prevenir esta complicación es guardar ayuno absoluto desde al menos 6 horas antes de la intervención.
- La administración de sueros que sean imprescindibles durante la anestesia, puede producir, excepcionalmente, reacciones alérgicas que pueden llegar a ser graves. Está desaconsejada la práctica sistemática de pruebas alérgicas a los fármacos que pueden emplearse durante la anestesia. Estas pruebas no están libres de riesgos y además, aun siendo su resultado negativo, no significa que no pudieran producir reacciones adversas cuando las empleamos durante la anestesia.

• Después de la anestesia general, pueden aparecer diferentes síntomas, como descenso de la tensión arterial, aumento de las pulsaciones, tos, depresión o dificultad respiratoria, agitación, retraso en la recuperación de la conciencia, mareo, náuseas, vómitos, ronquera, temblores, que en general son consideradas como molestias llegando, en muy pocos casos, a ser complicaciones.

7. RIESGOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE

Todo acto quirúrgico lleva implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos. Dependiendo de la situación vital del paciente, (existencia de situaciones como diabetes, cardiopatía, hipertensión, anemia, edad avanzada, obesidad) el riesgo anestésico puede ser mayor o aparecer complicaciones como

8. DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Don/doña.....de.....añosde edad, con domicilio en.....
y DNI.....

Don/doña..... de..... años de edad, con domicilio en.....
en calidad de (representante legal, familiar o allegado de la paciente).....

DECLARO:

Que el Doctor/a.....
me ha explicado que es conveniente/necesario, en mi situación la realización
de.....

En..... a..... de de 2.....

Fdo.: Don / doña..... DNI.....

Fdo.: Dr/a..... DNI.....

Colegiado n°:

9. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

Revoco el consentimiento prestado en fecha..... de..... de 2.....
y no deseo proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizado.

En..... a..... de de 2.....

Fdo. el médico

Fdo. el/la paciente

Colegiado n°: